

**DIABETE**

INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E/O PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI NEL DIABETE TIPO 1 IN ORARIO SCOLASTICO  
(secondo DGR 50-7641 del 21/05/2014)

**PARTE 1 – TERAPIA MULTIINIETTIVA/MICROINFUSORE**

IL MINORE \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_

affetto da Diabete tipo 1  
è attualmente in terapia insulinica intensiva con \_\_\_\_\_

Il paziente è portatore di monitoraggio continuo della glicemia      si      no

Il paziente è portatore di microinfusore      si      no

Presenta la necessità di somministrare in ambito ed orario scolastico/formativo la seguente terapia insulinica:

PASTI	FARMACO	DOSE FISSA	DOSE CON CALCOLO

Si sottolinea che tale schema può essere soggetto a variazioni (anche quotidiane) da parte della famiglia o del medico.

Modalità di conservazione dell'insulina in uso: temperatura ambiente.

L'eventuale insulina di scorta va invece conservata tra 4 e 8 gradi.

I genitori del paziente sono stati correttamente istruiti su tutta la gestione terapeutica del diabete e SONO / NON SONO Idonei a dare indicazioni sulle variazioni della terapia.

**DIABETE****PARTE 2 - GESTIONE DELL'IPOGLICEMIA**

Occasionalmente si può verificare un episodio di ipoglicemia anche durante la giornata (glicemia  $\leq 70$  mg/dl) e quindi anche durante l'orario scolastico, eventualmente associata a sintomatologia.

In presenza di allarme del sensore per ipoglicemia (se presente) o di sintomi (fame eccessiva, irritabilità, sudorazione, pianto, pallore, confusione, mal di testa, difficoltà di concentrazione, vertigini, affaticamento, tremori, vista annebbiata, dolori addominali o nausea) è indicato:

- eseguire una determinazione della glicemia capillare;
- in caso di riscontro di glicemia inferiore o uguale a 70 mg/dl è necessario:
  - 1) somministrare \_\_\_\_ bustina/e di zucchero da 5 gr o glucosio (\_\_\_\_\_ fiala/e Glucosprint)
  - 2) ricontrollare la glicemia dopo 15 – 20 minuti, eventualmente da sensore:
    - a) se  $\geq 80$  mg/dl o la freccia del sensore è rivolta verso l'alto, l'ipoglicemia è risolta;
    - b) se  $< 80$  mg/dl, assumere nuovamente \_\_\_\_\_ bustina/e di zucchero o glucosio.

**In caso di ipoglicemia grave (perdita di coscienza, crisi convulsiva, emiparesi transitoria) deve essere immediatamente somministrato glucagone: (nome farmaco = \_\_\_\_\_) alla dose: \_\_\_\_\_**

**Contestualmente devono essere attivati i soccorsi - 112.**

Modalità di conservazione del farmaco: può essere conservato a temperatura ambiente.

Torino \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del medico del servizio