

DOPPIA DIAGNOSI: RISCHIO / PREGRESSA ANAFILASSI + ASMA BRONCHIALE**PIANO D'AZIONE PERSONALIZZATO**

Cognome e Nome* _____ Nato il * _____

CF/STP/ENI* _____ (16 caratteri) Scuola* _____

Classe/Sezione* _____ Telefono: genitore 1 * _____ genitore 2* _____

Allergia a (SPECIFICARE):* _____

*(CAMPI OBBLIGATI)

I SEGNI DI REAZIONE ALLERGICA INCLUDONO:SISTEMI:SINTOMI:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Occhi | arrossamento e/o sfregamento degli occhi, lacrimazione |
| 2. Naso | sternuti ripetuti, prurito nasale, naso "che cola", sensazione acuta di naso tappato |
| 3. Bocca | prurito & gonfiore delle labbra, lingua o bocca |
| 4. Cute | senso di calore, prurito al cuoio capelluto, orticaria, eruzione pruriginosa e/o gonfiore della faccia o di mani / piedi e/o della zona peri-genitale |
| 5. Intestino | nausea, crampi addominali, vomito e/o diarrea |
| 6. Respiro | <u>A.</u> accessi di tosse stizzosa e persistente, respiro accelerato, sibili respiratori (fischio), rientramenti alla base del collo, tra le coste e il diaframma
<u>B.</u> senso di chiusura e/o nodo alla gola e/o senso di soffocamento, raucedine acuta, difficoltà respiratoria, cianosi (labbra e cute bluastre), arresto respiratorio |
| 7. Circolo/
Sistema nervoso | pallore intenso, malessere generale, debolezza, sonnolenza, vertigine, battito cardiaco accelerato/lento/ irregolare, PERDITA DI COSCIENZA |

N.B. La severità dei sintomi può cambiare rapidamente evolvendo in situazioni pericolose per la vita**PRESCRIZIONE FARMACI - calcolati per peso corporeo****ANTISTAMINICO: *OBBLIGATO UN SOLO CAMPO dei SEGUENTI***

- ☐ **FENISTIL gocce:** n° _____ gocce per bocca oppure ☐ **FENISTIL compresse:** n° _____ compresse per bocca
- ☐ **KESTINE LIO compresse:** 1 compressa da porre sulla lingua
- ☐ **Altro ANTISTAMINICO (SPECIFICARE)** se questa voce viene fleggata, obbligatori tutti i campi seguenti

NOME COMMERCIALE _____ FORMULAZIONE _____ DOSAGGIO _____ PER BOCCA

CORTICOSTEROIDE: BENTELAN compresse effervescenti da 1 mg n° _____ compressa/e per bocca**ADRENALINA - SPUNTARE IL DOSAGGIO SCELTO****FAST JEKT o CHENPEN o JEXT :** ☐ **150 mcg** ☐ **300 mcg** ☐ **500 mcg****BRONCODILATATORE****Salbutamolo o Ventolin o Broncovaleas** spray: 3 puff subito (con distanziatore), distanziati un minuto uno dall'altro

- il ciclo di 3 puff è ripetibile ogni 20 minuti, massimo per altre due volte (massimo 9 puff in totale)

NB: TUTTI I FARMACI DEVONO ESSERE CONSERVATI A TEMPERATURA AMBIENTE, LONTANO DA FONTI DI CALORE, E RIPARATI DAL FREDDO E DAI RAGGI DIRETTI DEL SOLE. L'ADRENALINA DEVE ESSERE CONSERVATA AL BUIO.

EVENTUALI CORREZIONI/INTEGRAZIONI DEVONO ESSERE CORREDATE DA DATA, TIMBRO E FIRMA DEL PRESCRITTORE.


IL PRESENTE MODULO EDITABILE DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, TRASFORMATO IN PDF NON MODIFICABILE E FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMA Digitale o Timbro e Firma del medico*

Data* _____

*(Campi obbligati)

DOPPIA DIAGNOSI: RISCHIO/PREGRESSA ANAFILASSI + ASMA BRONCHIALE



LEGENDA DELLA FLOW CHART

SE L'ASSUNZIONE DELL'ALIMENTO/PUNTURA DI INSETTO
È CERTA O ANCHE SOLTANTO SOSPETTATA

A) chiamare SUBITO il 112 e segnalare IL RISCHIO ANAFILASSI*

B) se compaiono uno o più SINTOMI da 1 a 4:

- 1) SOMMINISTRARE SUBITO Antistaminico e Bentelan - come da prescrizione a pagina 1 -
- 2) RIMANERE IN OSSERVAZIONE ATTENTA E COSTANTE DEL PAZIENTE FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI

C) se compaiono uno o più SINTOMI tra quelli elencati da 5 a 7:

somministrare SUBITO ADRENALINA

D) QUALORA DA SUBITO COMPARISSERO I SINTOMI da 5 a 7, CON O SENZA ALTRI SINTOMI DA 1 a 4:

somministrare SUBITO ADRENALINA

E) se presenti i SINTOMI RESPIRATORI DEL PUNTO 6,

somministrare ANCHE IL BRONCODILATATORE come prescritto a pag. 1

IN ASSENZA DI CERTEZZA/SOSPETTO DI
ASSUNZIONE DELL'ALIMENTO/PUNTURA DI INSETTO

F) se compaiono SOLTANTO i SINTOMI del punto 6:

1) chiamare SUBITO il 112 segnalando la CRISI ASMATICA in un soggetto a rischio ANCHE di anafilassi

2) somministrare IL BRONCODILATATORE come prescritto a pag. 1



3) continuare l'osservazione attenta del minore fin quando non arrivano i soccorsi - 112

G) se compare ANCHE SOLTANTO UN ALTRO SEGNO/SINTOMO tra quelli da 1 a 7:

somministrare SUBITO ADRENALINA

***dopo aver allertato il 112 e gestito il minore avvisare i genitori**

COME SOMMINISTRARE IL BRONCODILATATORE SPRAY



CORRETTA POSTURA IN CASO DI REAZIONE ALLERGICA DI TIPO ANAFILATTICO


1. SE IL SOGGETTO E' PALLIDO, DEBOLE, HA CAPOGIRO

SDRAIARLO E TENERE LE GAMBE SOLLEVATE



2. SE IL SOGGETTO RESPIRA MALE

TENERLO IN POSIZIONE SEDUTA



3. SE IL SOGGETTO E' PALLIDO, DEBOLE, HA CAPOGIRO E RESPIRA MALE

METTERLO IN POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA



CORRETTO UTILIZZO DELL'ADRENALINA AUTO-INIETTABILE

CORRETTO UTILIZZO DELL'ADRENALINA AUTO-INIETTABILE

FASTJEKT o JEXT



1. estrarre la penna dalla custodia in plastica rigida



2. impugnare la penna con la mano dominante



3. togliere il tappo di sicurezza (azzurro o giallo) il lato ago (arancione o nero) è verso il basso



4. appoggiare il lato ago (arancione o nero) sul lato esterno della coscia tenere ferma la gamba su cui si inietterà l'adrenalina premere con forza il lato ago sulla pelle (un rumore ne segnala la fuoriuscita)




5. tenere saldamente premuto contro la coscia per 10 secondi



6. dopo 10 secondi allontanare la siringa dalla coscia il copriago (arancione o nero) sarà fuoriuscito e l'ago non sarà visibile massaggiare il punto di iniezione

CHENPEN



1. estrarre la penna dalla custodia in carta



2. togliere il copriago nero



3. Impugnare la penna con la mano dominante



4. togliere il tappo grigio di sicurezza



5. appoggiare il lato ago sul lato esterno della coscia tenere ferma la gamba su cui si inietterà l'adrenalina premere il pulsante rosso



6. tenere saldamente premuto contro la coscia per 10 secondi



7. dopo 10 secondi allontanare la siringa dalla coscia proteggere l'ago fuoriuscito con il copriago massaggiare il punto di iniezione